



13^{ème} Journée d'Automne
de l'Association des Hygiénistes de Picardie

Testons vos connaissances sur les antiseptiques

Annie BRENET

Consignes

Avant de voter, attendre que le  passe au vert

Appuyer sur les touches 1, 2, 3, ... en fonction de la réponse choisie

Vous ne pouvez choisir qu'une réponse

Une fois votre choix fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière

1 point par bonne réponse !





Question 1

La chlorhexidine aqueuse n'est pas recommandée dans le cadre de la gestion des cathéters veineux

1 – Vrai


2 - Faux





Question 1

La chlorhexidine aqueuse n'est pas recommandée dans le cadre de la gestion des cathéters veineux





Question 2

Les antiseptiques peuvent entraîner des chocs anaphylactiques

1 – Vrai

2 - Faux





Question 2

Les antiseptiques peuvent entraîner des chocs anaphylactiques





Question 3

Les antiseptiques alcooliques sont plus efficaces que les antiseptiques aqueux

1 – Vrai


2 - Faux





Question 3

Les antiseptiques alcooliques sont plus efficaces que les antiseptiques aqueux





Question 4



L'alcool fixe les germes, il est donc déconseillé de l'utiliser pour désinfecter la peau et le matériel (valves bidirectionnelles, ampoules, ...)

1 – Vrai

2 - Faux



Question 4

L'alcool fixe les germes, il est donc déconseillé de l'utiliser pour désinfecter la peau et le matériel (valves bidirectionnelles, ampoules, ...)





Question 5



L'alcool présent dans les antiseptiques fragilise la peau

1 – Vrai

2 - Faux



Question 5

L'alcool présent dans les antiseptiques fragilise la peau





Question 6

L'allergie à l'iode empêche l'utilisation de la povidone iodée

1 – Vrai

2 - Faux






Question 6

L'allergie à l'iode empêche l'utilisation de la povidone iodée

1 – Vrai | 2%

2 - Faux  98%



Question 7

La désinfection cutanée avant la pose d'un cathéter, d'une aiguille de Huber ou d'un pansement de cathéter vasculaire doit être effectuée après une phase de déterSION, de rinçage et de séchage

1 – Vrai


2 - Faux





Question 7

La désinfection cutanée avant la pose d'un cathéter, d'une aiguille de Huber ou d'un pansement de cathéter vasculaire doit être effectuée après une phase de déterSION, de rinçage et de séchage





Question 8



L'antiseptique doit être rincé avant la mise en place du pansement sur le point de ponction lors de la mise en place d'un cathéter vasculaire

1 – Vrai


2 - Faux



Question 8

L'antiseptique doit être rincé avant la mise en place du pansement sur le point de ponction lors de la mise en place d'un cathéter vasculaire

1 – Vrai  6%

2 - Faux  94%



47

Question 9



Tous les antiseptiques peuvent être utilisés jusqu'à 15 jours après l'ouverture


1 – Vrai

2 - Faux



Question 9

Tous les antiseptiques peuvent être utilisés jusqu'à 15 jours après l'ouverture






Question 10


Pour connaître la durée d'utilisation des antiseptiques, il faut que ce soit écrit sur le flacon :

- 1 – Date ouverture
- 2 – La DLU
- 3 – Aucune date



Question 10

Pour connaitre la durée d'utilisation des antiseptiques, il faut que ce soit écrit sur le flacon :





Question 11


Une monodose est utilisable :

- 1 – Une seule fois
- 2 – Jusqu'à 6h
- 3 – Jusqu'à 12h



Question 11

Une monodose est utilisable :





Question 12


La Chlorexidine reconstituée avec le colorant est valable :


- 1 – Un jour
- 2 – Dix jours
- 3 – Un mois



Question 12

La Chlorexidine reconstituée avec le colorant est valable :





- Merci de votre participation
- Rendez-vous cet après-midi pour la correction !